

## G-B①(1サイクル目)

4週毎

| 薬品名 | 投与量 | 手技 | 点滴時間 |
|-----|-----|----|------|
|-----|-----|----|------|

<前投薬>オビヌツズマブ投与30分～1時間前に内服

Day 1, 8, 15

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1, 8, 15

|               |        |        |     |
|---------------|--------|--------|-----|
| 生理食塩液         | 50 mL  |        |     |
| クロルフェニラミン5 mg | 1A     | d.i.v. | 15分 |
| ヒドロコルチゾン      | 100 mg |        |     |

|       |        |        |     |
|-------|--------|--------|-----|
| 生理食塩液 | 100 mL | d.i.v. | 60分 |
|-------|--------|--------|-----|

|         |              |        |                  |
|---------|--------------|--------|------------------|
| 生理食塩液   | 210 mL       | d.i.v. | フィルター付きラインを使用のこと |
| オビヌツズマブ | 1000 mg/body |        |                  |

初回12.5 mL/hから開始し、30分毎12.5 mL/hずつUP可(最大100 mL/h)

2回目以降25 mL/hから開始し、30分毎25 mL/hずつUP可(最大100 mL/h)

|       |       |        |        |
|-------|-------|--------|--------|
| 生理食塩液 | 50 mL | d.i.v. | フラッシュ用 |
|-------|-------|--------|--------|

Day 2, 3

|            |        |        |     |
|------------|--------|--------|-----|
| グラニセトロンバッグ | 100 mL | d.i.v. | 30分 |
| デキサメタゾン    | 6.6 mg |        |     |

|         |                      |        |     |
|---------|----------------------|--------|-----|
| 生理食塩液   | 50 mL                | d.i.v. | 10分 |
| ベンダムスチン | 90 mg/m <sup>2</sup> |        |     |

|       |       |        |        |
|-------|-------|--------|--------|
| 生理食塩液 | 50 mL | d.i.v. | フラッシュ用 |
|-------|-------|--------|--------|

## G-B②(2~6サイクル目)

4週毎

| 薬品名 | 投与量 | 手技 | 点滴時間 |
|-----|-----|----|------|
|-----|-----|----|------|

<前投薬>オビヌツズマブ投与30分~1時間前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

|               |        |        |     |
|---------------|--------|--------|-----|
| 生理食塩液         | 50 mL  |        |     |
| クロルフェニラミン5 mg | 1A     | d.i.v. | 15分 |
| ヒドロコルチゾン      | 100 mg |        |     |

|       |        |        |     |
|-------|--------|--------|-----|
| 生理食塩液 | 100 mL | d.i.v. | 60分 |
|-------|--------|--------|-----|

|         |              |        |                  |
|---------|--------------|--------|------------------|
| 生理食塩液   | 210 mL       | d.i.v. | フィルター付きラインを使用のこと |
| オビヌツズマブ | 1000 mg/body |        |                  |

初回12.5 mL/hから開始し、30分毎12.5 mL/hずつUP可(最大100 mL/h)

2回目以降25 mL/hから開始し、30分毎25 mL/hずつUP可(最大100 mL/h)

|       |       |        |        |
|-------|-------|--------|--------|
| 生理食塩液 | 50 mL | d.i.v. | フラッシュ用 |
|-------|-------|--------|--------|

Day 2, 3

|            |        |        |     |
|------------|--------|--------|-----|
| グラニセトロンバッグ | 100 mL | d.i.v. | 30分 |
| デキサメタゾン    | 6.6 mg |        |     |

|         |                      |        |     |
|---------|----------------------|--------|-----|
| 生理食塩液   | 50 mL                | d.i.v. | 10分 |
| ベンダムスチン | 90 mg/m <sup>2</sup> |        |     |

|       |       |        |        |
|-------|-------|--------|--------|
| 生理食塩液 | 50 mL | d.i.v. | フラッシュ用 |
|-------|-------|--------|--------|