


ID: [redacted]
[redacted]
[redacted] 様
性別 [redacted] 生年月日 [redacted]

処方箋が出された場合には
治療と処方薬の確認のため薬局窓口で
この説明書を提示してください。

『サイラムザの副作用』
腹痛(吐き気、嘔吐、便秘を伴うこともあります)。血便が出る。
意識がなくなる。麻痺が出る。めまいがする。ろれつが回らない
上180ー下120を超えるほど、血圧が高くなる。
我慢できない頭痛がする。気分が悪い。吐き気がする。けいれんがある。
胸が痛い(締めつけられるような感じがする)
足がむくんだり、痛みがある。突然息切れがする。
口から血を吐く。
鼻血や歯肉・膣などからの出血(10~15分経っても止まらない場合)



頻度は少ないですが、このような症状
がみられたら、すぐにお知らせ下さい。
治療状況がいつでも把握できるように
お薬手帳は常に携帯してください。

備考
★発熱、空咳、呼吸困難などの症状が現れた場合にはすぐに連絡してください。まれな副作用ですが激しい腹痛、出血、麻痺等
が現れましたらすぐに連絡してください。
表以外の副作用が出ることがあり、個人差があります。症状が出た場合にはお薬手帳に記載しておいて来院時に状況をお伝
えください。また、稀な副作用などもありますが、詳しくはパンフレットを参照し、思い当たる点や不安がある場合にはお問い合わせ
ください。副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は異なります。患者さんご自身で工夫を
していただくと共に、辛いこと、困ったこと等ありましたら医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください。

 千葉県がんセンター 薬剤部
千葉市中央区仁戸名町666-2
CHIBA CANCER CENTER TEL: 043-264-5431