

ID: [Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted] 様
 性別 [Redacted] 生年月日 [Redacted]

処方箋が出された場合には
 治療と処方薬の確認のため薬局窓口で
 この説明書を提示してください。

【ABVD療法】
 スケジュール: 28日を1コースの治療として6~8コース繰り返し行います。
 体調や検査値、副作用によってはスケジュールや投与時間を変更する場合があります。

| | | 今回のサイクル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 次サイクル | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日付 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 点滴 | ドキソルビシン | ✂ | | | | | | | | | | | | | | ✂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エクザール (ピンプラステン) | ✂ | | | | | | | | | | | | | | ✂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ダカルバジン | ✂ | | | | | | | | | | | | | | ✂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射肉 | ブレオ (ブレオマイシン塩酸塩) | ✂ | | | | | | | | | | | | | | ✂ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副作用 | 血管外漏出 | 血管外に抗がん剤が漏れると炎症を起こします。点滴中から治療数日後に点滴部位の痛み、点滴部位の痛み、血管の痛み、腫れ、発赤等が出ましたらすぐにお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 血管痛 | ダカルバジンの光分解物により痛みを発生することがあります。ダカルバジンを遮光して投与します。点滴中に点滴部位の痛み、腫れ、発赤等が出ましたらすぐにお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 腫瘍崩壊症候群 | 急速に腫瘍が壊れることにより腎臓に負担がかかることがありますので、水分を十分にとり尿量を増やすように心がけてください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 悪心・食欲不振 | 治療法に対応した吐き気止めを使用しますが、治療日から数日間、むかつきや食欲不振が起こることがあります。個人差が大きいので、食事や水分が摂れない時にはお知らせください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 骨髄抑制 | 点滴後10~14日頃が白血球や血小板の数が一番少なくなることが予想されます。この時期は手洗い・うがいをして感染症にかからないよう心がけ、ケガや転倒に気をつけましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 口内炎 | 骨髄抑制の時期は特に起こりやすくなります。点滴後からうがいで口の中を清潔に保つよう心がけましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 便秘 | 抗がん剤や制吐剤によって腸の動きが悪くなります。水分を十分にとり、下剤を調節して便秘を予防しましょう。(市販の下剤でもかまいません。) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 脱毛 | 抗がん剤投与2~3週間後から起こります。頭髮以外の部分でも起こります。抗がん剤の治療終了3~6ヶ月後には再び生えてきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 末梢神経障害 | 感覚や運動の麻痺、手足のしびれ、手足の痛みなどを感じる場合があります。投与回数が増えると増強する傾向があります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考
 その他注意が必要な副作用として、心毒性(総投与量が大量になると出やすくなるため、規定の量を超えないようにしています)、間質性肺炎などがあります。治療期間中に息苦しい、咳が出る、熱が出るなどの症状が出た場合にはご連絡ください。
 ★この治療法は、作用の違う薬剤を組み合わせることで効果を高め、副作用を抑えています。副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は大きく異なります。患者さんご自身で工夫をされるとともに、辛いこと、困ったこと等ありましたら、医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください。

