

ID: [REDACTED]

[REDACTED] 様

性別 [REDACTED] 生年月日 [REDACTED]

処方箋が出されます。  
治療と処方薬の確認のため薬局窓口で  
この説明書を提示してください。

**【dose dense AC療法】**

スケジュール: 2週間に一度治療を行います(1サイクル)。

通常は2週間毎に治療を繰り返し、合計4サイクル、8週間治療します。

(体調や検査値、副作用によってはスケジュールや点滴時間を変更する場合があります。)

		今回のサイクル														次サイクル																											
		4														5																											
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
点滴	ドキシソピシン	[Icon]														[Icon]																											
	エンドキサン (シクロホスファミド)	[Icon]														[Icon]																											
皮下注	ジーラスタ (ペグフィルグラスチム)	[Icon]														[Icon]																											
副作用	悪心・食欲不振	[Green bar]																																									
	便秘	[Green bar]																																									
	口内炎	[Green bar]																																									
	骨髄抑制	[Green bar]																																									
	脱毛	[Green bar]																																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火

**備考** その他の副作用として、心毒性(総投与量が大量になると出やすくなるため、規定の量を超えないようにしています)  
治療期間中に息苦しい、咳が出る、熱が出るなどの症状が出た場合にはご連絡ください。  
副作用の出方には個人差があります。また、表以外の副作用も出ることがあります。不快な副作用はできるだけ軽くするように支援しますので、辛い症状がある場合には医療スタッフに相談してください。