

ID: [REDACTED]

[REDACTED] 様  
性別 [REDACTED] 生年月日 [REDACTED]

処方箋が出された場合には  
治療と処方薬の確認をするため  
薬局窓口でこの説明書を提示し  
てください。

**【BEP療法】**

スケジュール: 21日を1コースの治療として3~4コース繰り返し行います。  
体調や検査値、副作用によってはスケジュールや投与時間を変更する場合があります。

		今回のサイクル																					次サイクル																														
		4																					5																														
日付		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火										
点滴	シスプラチン	[Icon]																										[Icon]																									
	エトポシド	[Icon]																										[Icon]																									
	プレオ (プレオマイシン塩酸塩)	[Icon]									[Icon]									[Icon]									[Icon]									[Icon]															
	補液等	[Icon]																										[Icon]																									
	悪心・食欲不振	治療法に対応した吐き気止めを使用しますが、治療日から数日間、むかつきや食欲不振が起こることがあります。個人差が大きいため、食事や水分が摂れない時にはお知らせください。																																																			
	倦怠感	疲労感 だるさを感じることがあります。無理をせずできるだけリラックスしてお過ごしください。																																																			
	骨髄抑制	点滴後10~14日頃が白血球や血小板の数が一番少なくなることが予想されます。この時期は手洗い・うがいをして感染症にかからないよう心がけ、ケガや転倒に気をつけましょう。																																																			
	口内炎	骨髄抑制の時期は特に起こりやすくなります。点滴後からうがい口の中を清潔に保つよう心がけましょう。																																																			
	便秘	抗がん剤や制吐剤によって腸の動きが悪くなります。水分を十分にとり、下剤を調節して便秘を予防しましょう。(市販の下剤でもかまいません。)																																																			
	脱毛	抗がん剤投与と2~3週間後から起こります。頭髪以外の部分でも起こります。抗がん剤の治療終了3~6ヶ月後には再び生えてきます。																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火										

**備考**  
治療期間中に息苦しい、咳が出る、熱が出るなどの症状が出た場合にはご連絡ください。  
★この治療法は、作用の違う薬剤を組み合わせることで効果を高め、副作用を抑えています。副作用は不快なものですが、対処の仕方、気持ちの持ち方によって感じ方は大きく異なります。患者さんご自身で工夫をされるとともに、辛いこと、困ったこと等ありましたら、医療者(医師・看護師・薬剤師)にご相談ください。