

ID:

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

様

性別

[Redacted]


生年月日

[Redacted]

処方箋が出された場合には
治療と処方薬の確認のため薬局窓口で
この説明書を提示してください。

『サイラムザの副作用』

腹痛(吐き気、嘔吐、便秘を伴うこともあります)。血便が出る。
意識がなくなる。麻痺が出る。めまいがする。ろれつが回らない
上180ー下120を超えるほど、血圧が高くなる。
我慢できない頭痛がする。気分が悪い。吐き気がする。けいれんがある。
胸が痛い(締めつけられるような感じがする)
足がむくんだり、痛みがある。突然息切れがする。
口から血を吐く。
鼻血や歯肉・膣などからの出血(10~15分経っても止まらない場合)



頻度は少ないですが、
このような症状がみられたら、
すぐにお知らせ下さい。
治療状況がいつでも把握できるように

備考

★【パクリタキセルにはアルコールが入っていますので、治療日に車の運転はしないで下さい。まれな副作用ですが激しい腹痛、出血、麻痺等が現れましたらすぐに連絡してください】
副作用の出方には個人差があります。また、上の表以外の副作用が出ることもあります。
詳しくは小冊子を参照してください。
不快な副作用はできるだけ軽くするように支援しますので、辛い症状がある場合には医療スタッフに相談してください。



千葉県がんセンター 薬剤部
千葉市中央区仁戸名町666-2
CHIBA CANCER CENTER TEL:043-264-5431